

Etomidato

Prezado Colega:

O editorial da Revista Brasileira de Anestesiologia, volume 34, número 6, novembro-dezembro 1984, páginas 379 e 380 faz algumas considerações sobre o etomidato, recentemente apresentado à classe médica brasileira pela Janssen Farmacêutica.

Em face de algumas incorreções verificadas no texto e que podem ter importantes repercussões na utilização prática do produto, solicitamos-lhe a especial gentileza de publicar no próximo número as correções abaixo enumeradas:

1) - A apresentação do Hypnomidate® é sob a forma do etomidato puro em solução aquosa de propileno glicol a 35%.

2) - O pH da solução assim apresentada é 5.

3) - A dose hipnótica eficaz do Hypnomidate® se situa entre 0,2 e 0,3 mg. kg⁻¹ de peso corporal e não de 3,0 mg como foi publicado.

4) - Quanto à tolerância local, à administração intravenosa, intra-arterial e intramuscular de etomidato, em diferentes concentrações, realizada em coelho, foi comparada com tiopental. Nos animais que receberam tiopental observaram-se necrose e

fibrose dos músculos esqueléticos, bem como proliferação da íntima e formação de edema nas artérias, chegando, às vezes, à oclusão do vaso. Nenhum destes efeitos foi verificado com Hypnomidate®.

Tomamos a liberdade de enviar-lhe uma Documentação Científica de lançamento e nos colocamos à disposição para atendimento da bibliografia desejada.

Estamos certos de que esta carta merecerá de sua parte a mesma atenção e destaque com que foi veiculado o editorial.

Antecipamos nossos agradecimentos pelas providências justas e adequadas.

Valemo-nos desta para apresentar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Tércio Torres de Sá, MD
Deptº Médico-Científico
Janssen Farmacêutica
Rua Avanhandava, 55
01306 - São Paulo, SP