

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA

ÓRGÃO OFICIAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA

EDITOR
OSCAR V. RIBEIRO

DIRETOR (1951-52)
J. J. CABRAL DE ALMEIDA

REDADORES BRASILEIROS

MARIO C. D'ALMEIDA FILHO (D.F.)
ZAIRO E. GARCIA VIEIRA (D.F.)
J. AFFONSO ZUGLIANI (D.F.)
RENATO C. RIBEIRO (D.F.)
JORGE G. BRAUNIGER (D.F.)
A. PATURY E SOUZA (D.F.)
LEO CABRAL MENEZES (D.F.)
VICENTE F. GAEDE (D.F.)
R. SIMONARD SANTOS (D.F.)
ALEXANDRE CANALINI (D.F.)

LUIZ RODRIGUES ALVES (S. Paulo)
REYNALDO FIGUEIREDO (S. Paulo)
CARLOS PARSLOE (Santos, S.P.)
MILTON M. LUZ (Salvador)
FLAVIO K. PIRES (P. Alegre)
EUCLYDES MOTTA (B. Horizonte)
CUSTODIO ESTEVES NETO (Niterói)
JOSE' A. BASTO LIMA (Recife)
HAROLDO JUAÇABA (Fortaleza)
MENANDRO FARIA (Salvador)
WILSON C. MATTOS (Vitória)

REDADORES ESTRANGEIROS

M. COLLADOS STORNI (Argentina)
ITALO NUNZIATA (Argentina)
JUAN A. NESI (Argentina)
H. GRANT-WHYTE (África do Sul)
GEOFFREY KAYE (Austrália)
M. DIGBY LEIGH (Canadá)
ERNESTO FRIAS (Chile)
RICARDO MENDEZ PEÑATE (Cuba)
JOSE L. AVELLANAL (Cuba)

JOHN S. LUNDY (U.S.A.)
STUART C. CULLEN (U.S.A.)
HENRI S. RUTH (U.S.A.)
ROBERT MONOD (França)
R. R. MACINTOSH (Inglaterra)
GEOFFREY ORGANE (Inglaterra)
EUSEBIO LOPES SOARES (Portugal)
OLLE FRIBERG (Suécia)
ALFREDO PERNIN (Uruguai)

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, sala 846
178, Rua Sacadura Cabral — Rio de Janeiro — Brasil

Sociedade Alvéca Limitada




Aparelhagens de anestesia, para diversos gases, "Draeger".

Aparelhagens de gasoterapia "Draeger":

- a) inaladores de oxigênio,
- b) nebulizadores de medicamentos,
- c) aparelhos para oxigenioterapia via bucal, nasal e oro-nasal,
- d) tendas de oxigênio.

Aparelhagens de reanimação artificial "Draeger"



**AV. VENEZUELA N.º 27 = 8.º ANDAR
RIO DE JANEIRO**

**PROTÓXIDO DE AZOTO E OXIGÊNIO
MEDICINAL E INDUSTRIAL, DA MAIS
ALTA QUALIDADE E PUREZA**

ESTOQUE PERMANENTE

CIA. AGA DO BRASIL DE GAZ ACUMULADO

AV. BRASIL 8201

Caixa Postal 1823 — Fone 300256

RIO DE JANEIRO

Em São Paulo:


CIA. PAULISTA DE GAZ ACUMULADO

AV. PRES. WILSON 1716

Caixa Postal 3190 — Fone 320169

**APARELHOS DE ANESTESIA, ANALGESIA
E OXIGENOTERAPIA**

Fabricados por
AIRMED LIMITED
LONDRES - INGLATERRA



Distribuidores exclusivos para o Brasil

DAVIDSON, PULLEN & CIA.

Rua Visconde de Inhauma, 134 - 8.º pavimento

Tels.: 23-1953 - 23-1954 - 23-1955


RIO DE JANEIRO

Vendas no Rio de Janeiro a cargo de

CARLOS CERQUEIRA

Rua Pedro Américo, 31 — Tel.: 25-5350

Oficina especializada para manutenção e consertos



ANESTESIA ENDOVENOSA

com

KEMITHAL

Sempre que haja indicação para o uso de uma anestesia endovenosa, pode recorrer-se com proveito ao "KEMITHAL". Tanto para a anestesia de base como para a anestesia cirúrgica rápida ou prolongada, "KEMITHAL" tem provado ser altamente eficiente e satisfatório.

Ampôlas de 1 g.

Ampôlas de 2 g.

IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD.

Manchester

Inglaterra

Distribuidores

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO IMPERIAL S. A.

Caixa Postal, 953 — Rio de Janeiro


Rua Brigadeiro Tobias, 470 - 2.º and. - s/30

São Paulo

E. & J. Manufacturing Co.

APARELHOS DE ANESTESIA


Representantes e Distribuidores no Brasil



INDÚSTRIAS QUÍMICAS MANGUAL S. A.


Aparelhos de Anestesia E. & J.
FACILIDADE DE MANEJO — Simplicidade de Manutenção.
Absorvedor com 3 recipientes de cal sodada independentes.
Modelos Gabinete e stands.

RESSUSCITADORES



- Modelos hospitalares e portáteis.
- Pressão positiva e negativa em seqüências alternadas.
- Volume de oxigênio controlável para qualquer pulmão.
- Aspirador ao mesmo tempo.
- Inalador quando a respiração natural se restabelece.

RESSUSCINETE



- Berço transparente.
- Atmosfera úmida termo-regulável.
- Aspirador E. & J., incluso.
- Ressuscitado E. & J., incluso.
- Atmosfera de O₂ regulada.
- Franca portabilidade.
- Incubadora de urgência.

INDÚSTRIAS QUÍMICAS MANGUAL S. A.

MATRIZ: Rio de Janeiro — Rua Paulino Fernandes, 53-55 — Tel. 46-1818
C. Postal 3.705 — End. Telegr. "PICOT"
LABORATÓRIOS: Duque de Caxias — Estado do Rio — Rua Campos, 543
FILIAL: São Paulo — Rua Manoel Dutra, 218 — Tel. 32-9626
End. Telegr. "BAXTER"

CURARIZANTE
DE
SÍNTESE

FLAXEDIL

2559 F — 3697 RP

CAIXA DE 10 AMPOLAS DE 2 cm³ DOSADAS A 0,04 g
INJEÇÕES INTRAVENOSAS



CIRURGIA
ABDOMINOPELVIANA, TORÁCICA, PULMONAR
ANESTESIA ENDOTRAQUEAL
CONVULSOTERAPIA



ATIVIDADE DO CURARE NATURAL
LARGA MARGEM DE SEGURANÇA
SEM EFEITOS HISTAMÍNICOS



AMOSTRAS E LITERATURAS A DISPOSIÇÃO DA CLASSE MÉDICA



R H O D I A
CAIXA POSTAL 8095 — SÃO PAULO, SP



A marca de confiança

Aparelho de Anestesia - A G A - S U E C I A

MOD.º MDNC - 20 — "SPIROPULSATOR"

que proporciona respiração artificial automática



Distribuidores exclusivos:

CIA. T. JANÉR, COMERCIO E INDUSTRIA

Av. Rio Branco, 85 = 12.º = Fone 23-5931

Rio de Janeiro

Filiais: S. Paulo - Curitiba - P. Alegre - Belo Horizonte - Recife - Belém

KONDROCURARE

SOLUÇÃO a 0,25 % do CLORHIDRATO do DIMETILETER
da METIL-BEBEERINA

PROPRIEDADES:

- 1.º — Introduzido por via parenteral, produz diminuição do tonus muscular e paralisia flácida que atinge sucessivamente os vários grupos musculares. Os últimos músculos atingidos são sempre os da respiração e o último, o diafragma.
- 2.º — Introduzido por via venosa, os sintomas surgem quase imediatamente; quando introduzido no músculo, de 10 a 20 minutos após.
- 3.º — A duração dos sintomas depende da dose e da via de introdução. E' relativamente curta (15 a 30 minutos), quando injetado na veia; 1 ½ a 3 horas, quando introduzido por via intramuscular.
- 4.º — A eliminação do **KONDROCURARE** se processa pela urina. E' completa em menos de 24 horas, não se observando fenômenos de acumulação.
- 5.º — Não produz baixa acentuada da pressão arterial e brônquio-espasmos, complicações observadas com alguns curares.
- 6.º — Bloqueia primeiro os impulsos nervosos de maior freqüência de emissão, donde a sua ação eletiva sôbre o tonus e sôbre o hipertonus, quando êste existe.
- 7.º — Sua ação é periférica e se explica pela quebra do isocronismo entre nervo e músculo (Lapicque), conseqüente do aumento da cronaxia dêste; pelo aumento do limiar de excitabilidade do músculo à ação da acetilcolina, se aceitarmos a teoria da transmissão química dos impulsos nervosos.
- 8.º — A prostigmina e a fisostigmina são antagônicos do curare e fazem desaparecer os sintomas da curarização.

INDICAÇÕES:

Coadjuvante da anestesia durante as operações abdominais. No decorrer da convulsoterapia, para evitar as complicações traumáticas. Nas síndromes espásticas e atetósicas. Medicação auxiliar do tétano.

MODO DE EMPREGO E POSOLOGIA:


Consultar a bula ou pedir literatura ao
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Rua S. José 50, 2.º andar — Tel. 52-4200 — RIO



I N S T I T U T O V I T A L B R A Z I L

NITERÓI - EST. DO RIO

FOREGGER



Aparelhos de

Anestesia

e todos

acessórios

Intubação

endotraqueal

Gases e

Cal Sodada

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O BRASIL

SOCIEDADE IMPORTADORA GRASSI LTDA.

RIO DE JANEIRO	SÃO PAULO	BELO HORIZONTE
Rua Sen. Dantas 76	Rua 7 de Abril 342	Av. Afonso Pena 526
Tel. 22-1731	Tel. 3-9423	Tel. 4-2533

Demerol

MARCA REGISTRADA

ANALGÉSICO - ESPASMOLÍTICO - SEDATIVO

para as Dores de Qualquer Etiologia

OBSTETRÍCIA

Diminui o espasmo cervical acelerando o curso do trabalho de parto.

Não produz depressão respiratória nem retenção urinária.

Não acarreta perigo algum para a mãe ou para o filho.

Não traz complicações post-partum.

CIRURGIA

No **pré-operatório** contribui para a sedação psíquica do paciente; facilita a anestesia e permite menor quantidade de anestésico.

No **pós-operatório** proporciona analgesia intensa e, sendo de grande tolerabilidade, contribui para melhorar as condições do paciente.

MEDICINA

Indicado nas cólicas hepáticas, renais e intestinais; na dor pleurítica de qualquer etiologia; nos espasmos cardiovasculares dolorosos; na cefaléia hipertensiva; nas dores articulares e em várias condições neurológicas — clática, tabes dorsal e radiculites; na asma brônquica.

USO PARENTERAL: ampolas de 2 cm³ (100 mg) em caixas de 5 ou 50.

USO ORAL: Tubos de 10 comprimidos de 50 mg.

DEMEROL é um produto WINTHROP

Demerol só pode ser prescrito em formulário especial do S.N.F.M.
(tabela B)

DISTRIBUIDORES:

The Sydney Ross Company, Rio de Janeiro, Brasil

EVALDO PAES BARRETO & CIA. LTDA.

IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Material e Vidraria	{ Banco de sangue Ambulatórios Laboratórios Enfermarias Museus e Mostruários
------------------------------------	---

RUA MEXICO, 120 - 2.º S/LOJA 3

Telefone: 42-0813 — Caixa Postal 2198

End. Tel.: "Rioevaldo" - Rio de Janeiro

**A ÚNICA FIRMA ESPECIALIZADA EM VIDRARIA
PARA TODOS OS FINS**

Oficina Mecano-Cirúrgica

C A R L O S C E R Q U E I R A

RUA PEDRO AMERICO, 31

FONE: 25-5350

Mecânica fina, concertos de Aparelho de Anestesia,

Tendas de Oxigênio, fabrico de Negastoscópios

e todos acessórios de Raios X.

Galvanoplastia.



para

**PRÉ=NARCOSE e
ANESTESIA DE BASE**

(Dilaudid 0.002 g e Escopolamina Cl. 0.0003 g)

Vantagens do componente

DILAUDID "KNOLL"

em relação à morfina:

- 1. Intensa ação analgésica.**
- 2. Efeito rápido.**
- 3. Boa tolerância.**
- 4. Quase nenhuma influência sobre o peristaltismo.**

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS "KNOLL"

Rio de Janeiro

Caixa Postal 1469

DELVINAL

SHARP & DOHME

(vinbarbital sódico)

5-etil 5- (1 metil 1-butenil) barbiturato sódico



Sedativo e hipnótico de alto valor e de toxidez quase nula. Administrado por via oral, produz efeito rápido sem causar entorpecimento durante o período da indução. Moderada duração de ação. Ausência de sintomas e de reações desagradáveis, após o despertar. Não afeta a pressão arterial ou a respiração nem provoca alterações patológicas no sangue e na urina. Larga margem de inocuidade, maior que a de outros barbitúricos.

INDICAÇÕES

Insônia funcional — Estados nervosos e de agitação mental.
Hipnose pré-anestésica — Sedação pré-operatória — Amnésia obstétrica.

POSOLOGIA

INSÔNIA: 0,10 g ao deitar-se.

HIPNOSE PRÉ-ANESTÉSICA: 0,10 g a 0,20 g uma hora e meia antes da operação, independentemente da anestesia a ser usada.

OBSTETRÍCIA: Dose inicial de 0,40 g (que pode ser acompanhada de 0,0005 g de escopolamina), continuando, caso necessário, com 0,20 g a 0,40 g.

APRESENTAÇÃO

Cápsulas de 0,10 g, em vidros de 10, 100 e 1000 cápsulas.

SHARP & DOHME

PHILADELPHIA, E. U. A.

REPRESENTANTES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
PARA O BRASIL

S A C I P A

S. A. Comércio e Importação de Produtos Americanos

RUA CLARISSE ÍNDIO DO BRASIL, 20

RIO DE JANEIRO

3 x

CORAMINA-

-ADENOSINA

-EFEDRINA

-CAFEINA-CIBA

CORAMINA-ADENOSINA - Vasodilatador coronário. Angina do peito

CORAMINA-EFEDRINA - Vasoconstritor periférico. Antiasmático

CORAMINA-CAFEÍNA - Cárdio-exitante. Esgotamento físico e mental

EMPÔLAS

GOTAS

COMPRIMIDOS

PRODUTOS QUÍMICOS CIBA S. A.

RIO DE JANEIRO
C. P. - 3437

SÃO PAULO
C. P. - 3678

PORTO ALEGRE
C. P. - 1471

BELO HORIZONTE
C. P. - 123

RECIFE
C. P. - 439